Lue une fois
lue une 2e fois
et corrigée

n.° ~~54~~ 9.

Luxation Complette de la teste et Du Fæmur, en Dehors, Du coté gauche.

En 1740 au Mois de febvrier un homme Agé de 32 ans, étant a travailler dans le fond d'une carierre, et voulant etayer une grosse pierre, Des terres qui etoient audessus S'Eboulerent Sur Luy et le Renverserent. la pierre Sortit de sa place et en roulant vint passer Sur ces Jambes, Sans lui faire pourtant aucune playe. Il perdit Connoissance ~~et~~ Ses camarades l'Enleverent de ce lieu, et le porterent chez un Chirurgien qui le Saigna une fois. La Connoissance lui etant revenu, il se fit transferer a l'hotel-Dieu, car il ne pouvoit remuer la cuisse qu'il ne ressentit des douleurs extremes. Des qu'il y fut arrivé l'on réitera la Saignée, et peu de tems aprés Monsieur Boudou le Vit. la tumeur qu'il Remarqua exterieurement, le racourcissement du membre, La direction ~~interieure~~ en dedans du pied ~~qui etoit plus interieure qu'exterieure~~, les douleurs qu'il ressentoit lorsque l'on vouloit l'éloigner de

ARC 41
n° 8
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cette Situation, tous ces differents Signes Luy
firent Connoître que C'étoit une Luxation du
femur endehors. Comme cet homme etoit fort et
Robuste L'on se Servit de lien pour la Reduire.
L'on les attacha audessus du Condile du Femur,
Ayant garni la partie auparavant d'une Compresse
Circulaire. un Chirurgien prit le pied, Six autres
les bouts du lien, et tous ensemble firent L'exten^on^
tandis que le Corp etoit assujetti avec un Drap
Que l'on avoit attaché a une barre de traverses
Qui etoit au Chevet du Lit. Mons^r. Boudou durant
Ce temps avoit une main appuyée Sur la partie
inferieure, et interne de la Cuisse, tandisque avec
Son autre main il faisoit ces Effort pour repousser.
La teste du femur en dedans. Mais ces Moyens
ne furent pas Suffisant, et L'on fut Contraint
D'en ajoutter un autre. L'on se Servit d'un baton
que l'on Situa transversalement a la partie interne
et inferieure de la Cuisse, entre luy et la partie
l'on mit une oreillée, pour ne la point blesser.
toutes Choses arrangées Comme je Vient de le
Decrire, l'on Recommança l'Extension, et quand l'on
la Crut Suffisante pour que la teste fut proche du

Rebord interieur delalavité, celuy quitenoit le Baton letira fortement aluy. (nota, queparce – + Mouvement il ~~Eloig~~ aprochoit lapartie interieure Dufemur desapartie externe) tandisque Monsr. Boudou avec ses deux mains faisoit ces Efforts pour Repouser ~~latente~~ Sapartie Superieure en dedans. cefut par ces different Mouvement – quil reduisit laluxation, lonpança apres cela le Malade selon lamethode ordinaire, et Lonle Saigna pourla 6e fois. Le 10e jour apres cette operation – ylluy Survint une retention durine pourlaquelle ylfut Sondé. depuis cetemps il na eu aucun autre accident. pourlepresent il est parfaittement bien – gueri, et Se Sert desaCuisse avec autant de – Force qu'auparavant. –

ylneput medonner aucun Eclairussement Sur laCause desamaladie. tout cedont ylmassura – Cest qu'en tombant Sacuisse droitte Sétoit trouvé Engagée Sous la Gauche, et que Lapierre enpassant Surluy avoit porté Surle genou Gauche. jai Cru Devoir Marquer cette circonstance, parceque la – Situation dela Cuisse droitte ma parut fournir – un point dappuy propre a ~~favoriser~~ produire une pareil Luxation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.° 9.